

УДК 636.06

К.П. РІЗНООКА

Інститут тваринництва центральних районів УААН

ЕКСТЕР'ЄРНА ОЦІНКА БУГАЇВ РІЗНОГО ЕКОГЕНЕЗУ ТА ЇХНІХ ДОЧОК У СТРУКТУРІ СТВОРЮВАНОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Викладено результати вивчення розвитку та тілобудови бугаїв різного екогенезу, які використовувались при створенні червоної молочної породи в регіоні Центрального Степу України, та їхніх дочок за модельним відхиленням індексів.

Екстер'єр, бугай, порода, екогенез, мінливість

Червона степова порода найбільш поширенна в центральних та південних областях України. Це витривала, добре пристосована до сухого жаркого клімату, невибаглива до кормів порода, що має суху, міцну конституцію. Разом з тим вона недостатньо пристосована до інтенсивного ведення молочного скотарства.

Створення нової червоної молочної породи на основі червоної степової відбувається із зачлененням у породоутворювальний процес бугаїв голштинської, англерської та складних генотипних структур (АН+Г).

За допомогою біотехнічних методів відтворення вдалося за короткий час змінити не тільки фенотипні ознаки популяції червоної степової породи, а й їхні генотипні характеристики. Роль спадковості плідників у генетичному поліпшенні молочних порід великої рогатої худоби за різними джерелами досягає 80-95% [2, 4, 5]. Вченими доведено, що ефективність використання бугаїв залежить не лише від кровності за поліпшувальною породою, а й від якості використовуваних бугаїв [1, 3, 6, 7].

Відомо, що основою вдосконалення існуючих та виведення нових порід є об'єктивна оцінка за комплексом селекційних

© К.П. Різноока, 2005

Розведення і генетика тварин. 2005. Вип 39.

ознак бугаїв, у тому числі — соматометричними ознаками. Тому нами було проведено дослідження щодо визначення типів конституції за показниками будови тіла та величин модельних відхилень за індексами екстер'єру у бугаїв поліпшувальних порід та синтетичних генотипів, а також їхніх дочок у розрізі їхнього походження.

Методика досліджень. Бугаїв розподіляли по групах залежно від породи та країни походження. Вивчали живу масу й оцінку екстер'єру бугаїв ($n = 44$) та їхніх дочок ($n = 1318$) голштинської, англерської порід та складних генотипних структур (АН+Г), що належать Дніпропетровському племінному підприємству, які використовувались при створенні центрального зонального типу червоної молочної породи.

Соматометричні параметри у бугаїв визначали у повновіковому віці, у дочок — після першого отелення. Визначали індекси костистості, щільноти та рихlosti, широкий вузькотіlosti по кожній групі та порівнювали з модельними показниками (середніми в межах породи) [8]. За допомогою модельних відхилень визначали особливості тілобудови груп тварин. За модельні показники було прийнято середні величини відповідних індексів у межах породи по всіх країнах. Усі розрахунки проводились за допомогою комп'ютерної програми Statistica 6.0.

Результати досліджень. За власними дослідженнями виявлено, що бугаї голштинської породи ($n = 24$) за соматометричними параметрами перевершують англерських ($n = 16$) за всіма показниками (рис. 1, 2). Плідники синтетичних генотипів ($n = 4$) мають живу масу $993 \pm 38,2$ кг і перевершують англерських та голштинських бугаїв на 95,6 і 81,7 кг відповідно. За екстер'єрними промірами — ширину в маклаках, косою довжиною тулуба та обхватом грудей за лопатками — вони перевершують голштинських на 2,1; 2,2; 3,4 см відповідно ($P = 0,95$), а за рештою промірів займають проміжне положення між голштинською та англерською породами.

Бугаї однієї породи, але різного екогенезу мають певну різницю в тілобудові та живій масі. Так бугаї голштинської породи із Канади мають найменшу живу масу — $890,2 \pm 33,7$ кг з високим рівнем мінливості ($Cv = 11,9\%$), а найбільша жива маса була у бугаїв із Німеччини — $930 \pm 21,3$ кг. Найвищі показники за




Рис. 1. Соматометричні показники бугайів голландської породи та їхніх дочок




Рис. 2. Соматометричні показники бугайів англійської породи та їхніх дочок

Групи бугайів по породах за складеностю	Кількість голів	Показники індексів			
		костисті	щільність та ріхlosті	широко-та вузькоголові	грудей заду
<i>Абсолютні значення золотинської породи</i>					
Німеччина	7	16,9	79,4	23,4	25
Росії	5	17,2	68,9	25	24,9
Канада	12	15,5	79,2	23,6	25,3
Середні показники	10,3	17,2	77,2	23,4	25
<i>Моделі відхилення</i>					
Німеччина	7	4	3	0	0
Росії	5	6	-10	7	0
Канада	12	-5	3	-3	1
<i>Заборонені значення бугайів англійської породи</i>					
Німеччина	3	17,5	74,2	23,5	25,2
Україна (AH+T)	16	17,6	81,4	24,0	26,4
Середні показники	4	17,8	81,4	23,2	25,8
Німеччина	0	0	-7	0	-1
Україна (AH+T)	16	0	2	2	4
	4	1	2	-2	2

I. Моделі відхилення індексів у бугайів

висотою в холці, глибиного грудей та косого ловжиною тулуба мали бугай із Канади, а найбільшу ширину грудей та в кілубах, обхват грудей за лопатками та обхват п'ястка — із Росії. Бугай із Німеччини за цими показниками займали проміжне положення між тваринами канадського та російського походження. За соматометричними показниками найбільші консольовані виявилось поголів'я бугайів із Росії ($Cv = 0,8-3,9\%$), а найменші розноманітним — із Канади ($Cv = 2,2-8,4\%$).

Жива маса бугайів англійської породи ($n = 16$) становила $894 \pm 16,1$ кг, а бугайів різного походження — коливалась у межах $884-958$ кг. За соматометричними промірами найбільш розкиненими були бугайів із Німеччини.

Для виявлення особливостей тілоуточви бугайів різного походження (грубість, піжність, гільтьєсть та інш.) за допомогою тюбуцію порівнювали показники кожної групи з модельними показниками (табл. I.2).

2. Модельні відхилення індексів у дочок бугайів різного походження

Групи бугайів по породах за екогенезом	Кількість голов	Показники індексів			
		костистості	щільноти та рихлості	широко- та вузькотілості	
				грудей	заду
<i>Абсолютні значення дочок голштинської породи</i>					
Німеччина	66	14,9	50,5	25,2	25,6
Росій	59	17,1	51,8	22,9	28,2
Канади	633	14,8	49,3	23,5	27,0
Середні показники		14,9	49,7	23,6	26,9
<i>Модельні відхилення</i>					
Німеччини	66	0	2	7	-5
Росій	59	15	4	-3	5
Канади	633	-1	-1	0	0
<i>Абсолютні значення бугайів англіерської породи</i>					
Німеччини	112	14,7	71,2	24,2	26,5
України	229	14,7	74,0	24,1	26,1
Середні показники		14,7	73,7	24,1	26,3
<i>Модельні відхилення</i>					
Німеччини	112	0	-3	0	1
України	229	0	0	0	-1
(АН+Г)	219	1	-3	6	-7

Оцінка одних і тих самих тварин велась одночасно в трьох напрямках. Голштини канадського походження визначаються як грубоцільні, широкотілі, російського – груборихлі, широкогруді та вузькозаді, канадського – ніжноцільні, трохи вузькуваті в грудях та широкозаді.

Англери німецького походження – ніжнорихлі, широкотілі, а вирощені в Україні – грубоцільні та широкотілі.

Плідники складних генотипічних структур – грубоцільні, вузькогруді та широкозаді.

Дочки, одержані від бугайів голштинської породи ($n = 815$), за живою масою перевершують дочок, одержаних від англіерських ($n = 343$) та номісних ($n = 200$) бугайів на 12,6 і 12,2 кг відповідно. За висотою в холці, шириною в клубах, косою довжиною тулуба та обхватом п'ястка дочки голштинських плідників перевершують ровесниць, що походять від англіерських та бугайів склад-

них генотипів. Найбільша глибина грудей була у дочок англерських бугайів ($69 \pm 0,3$ см), а ширина грудей ($49 \pm 0,4$ см) та обхват грудей за лопатками ($193 \pm 0,5$ см) найбільшими були у дочок бугайів складних генотипів.

За модельними відхиленнями дочки одержали таку характеристику: нащадки німецьких голштинських бугайів — грубошильні, широкі в грудях та вузькозаді, російських — дуже грубошильні, вузькогруді та широкозаді, а канадських — найбільш близькі до модельних показників. Дочки німецьких англерських плідників були груборихлі та широкотілі, а українських — дуже близькі до модельного класу, але більш вузькозаді. Нащадків плідників складних генотипів порівнювали з аналогами по англерській породі. Виявилось, що ці тварини груборихлі, широкогруді та вузькозаді.

Висновки. Виявлено високий рівень подібності бугайів новостворюваної червоної молочної породи за комплексом соматометричних параметрів. Найбільшою консолідованістю характеризуються голштини німецького та російського походження, різноманітністю — канадського. Дочки канадських бугайів голштинської породи найбільш близькі до модельного класу, а найбільші відхилення від модельних мають дочки російських голштинів. Нащадки англерських бугайів, які народились в Україні, мають показники, близькі до модельних. Найбільший ступінь комбінативної мінливості, особливо за шириною грудей та косою довжиною тулуба, мають дочки складних генотипів структур.

Визначено резерви внутріпородної мінливості за типами конституції при використанні плідників різного екогенезу. Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення взаємозв'язку між соматометричними параметрами та продуктивними ознаками.

1. Ашоненко В.І. Племінна цінність голштинських бугайів у різних умовах використання // Розведення і генетика тварин. — К., 1999. — Вип. 31-32. — С. 7.

2. Басовський М.З., Рудик І.А., Буркат В.П. Вирощування, оцінка і використання плідників. — К., 1992. — С. 216.

3. Буркат В.П., Карасик Ю.М. Совершенствование пород крупного

- рогатого скота // Развитие селекции и совершенствование племенного дела в животноводстве. – К., 1986. – С. 25.
4. Дубін А.М. Роль бугай-лідерів у генетичному поділенні популяції // Розведення і генетика тварин. – К., 1995. – Вип. 27. – С. 32-36.
 5. Зубець М.В., Карасик Ю.М. Буркат В.П. Преобразование генофонда пород. – К., 1990. – 325 с.
 6. Мовчан Т.В., Козловська М.В. Вдосконалення генофонду червоної степової породи з використанням покращуючих порід // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2002. – С.133-138.
 7. Прохоренко Н.Н., Логинов Ж.Г. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве. – М., 1986. – 191 с.
 8. Хмельничий Л.М. Екстер'єрний тип корів і рівень зв'язку з продуктивністю // Тваринництво України. – 2003. – № 10. – С. 14.
 9. Колесник Н.Н. Методика определения типов конституции животных // Тваринництво України. – 1960. - № 3. - С. 48-51.

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭКОГЕНЕЗОВ И ИХ ДОЧЕРЕЙ В СТРУКТУРЕ СОЗДАВАЕМОЙ КРАСНОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ. Е.П. Ризноока

Изложены результаты изучения развития и телосложения быков-производителей различного экогенеза, участвующих в создании красной молочной породы в регионе Центральной Степи Украины, а также их дочерей по модельным отклонениям индексов.

Экстерьер, быки-производители, порода, экогенез, изменчивость

EXTERIOR EVALUATION OF DIFFERENT ECOGENESIS Sires AND THEIR DAUGHTERS IN STRUCTURE OF CREATED RED DAIRY BREED OF CATTLE. E.P. Riznooka

The results of study of individual development and build of different ekogenesis bulls participating in creation of Red Diary breed of cattle in the area of Central Steppe of Ukraine, and also their daughters on model deviations of indexes, were stated.

Exterior, sire bulls, breed, ekogenesis, variability