

УДК 636.2.082.

В.П. ТКАЧУК*

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАННЯ М'ЯСНИХ ПОРІД ПРИ СХРЕЩУВАННІ З ЧОРНО-РЯБОЮ ХУДОБОЮ НА ПОЛІССІ

Викладено результати досліджень ефективності поєдань м'ясних порід при схрещуванні з чорно-рябою худобою на Полісся.

Жива маса, середньодобові приrostи, проміри, забійна маса, забійний вихід

На сучасному етапі розвитку України створюється нова галузь тваринництва — м'ясне скотарство. Створення самостійної галузі спеціалізованого скотарства зумовлено необхідністю збільшення виробництва яловичини і підвищення її якості. Особливо прискореними темпами здійснюється створення галузі м'ясного скотарства на Полісся. Це зумовлено природно-економічними, соціальними, ресурсо-енергетичними та екологічними чинниками.

Одним із головних чинників підвищення ефективності виробництва яловичини у м'ясному скотарстві є порода. Проте в господарствах України частка тварин спеціалізованих порід і типів незначна. Тому створення галузі м'ясного скотарства відбувається шляхом схрещування корів із бугаями спеціалізованих м'ясних порід. При проведенні цієї роботи важливе значення має виявлення найбільш ефективних поєдань молочних і м'ясних порід.

Метою наших досліджень було виявити найкращі поєдання при схрещуванні корів української чорно-рябої молочної породи із бугаями м'ясних спеціалізованих порід.

Матеріали і методика досліджень. У колективному сільськогосподарському підприємстві "Полісся" Овруцького району Житомирської області проведено науково-виробничий дослід. На коровах чорно-рябої породи використовували бугай-плідників симентальської, української, волинської та поліської м'ясних порід. Було сформовано п'ять дослідних груп тварин по 20 голів кожна: українська чорно-ряба (контрольна); українська чорно-ряба ×

* Науковий керівник — доктор сільськогосподарських наук, професор Й.З. Сірацький.

• поліська м'ясна порода; українська чорно-ряба × симентальська м'ясна порода; українська чорно-ряба × українська м'ясна порода; українська чорно-ряба × волинська м'ясна порода.

Для досліду відбирали молодняк при народженні. Тварини перебували групами в однакових умовах годівлі та утримання. Забивали тварин у 12,5-місячному віці.

Результати досліджень. Одержані помісі вже у першому поколінні переважають за живою масою тварин вихідної материнської породи — української чорно-рябої. Ця перевага спостерігається в усіх вікових періодах: у новонарежених — 2,7–12,1 кг, у 3 міс. — 10,8–21,4, у 6 — 35,3–51,7, у 9 — 35,6–60,5, у 12 — 28,8–58,2, у 15 міс. — 44,6–75,0 кг. Слід відзначити, що, не зважаючи на більшу живу масу помісних телят при народженні, у чорно-рябих самок під час отеленя ускладнень не спостерігалося.

Помісні тварини характеризуються вищою інтенсивністю росту (табл. 1).

1. Середньодобові приrostи піддослідних тварин, г

Порода, породне поєднання	Мтм	Вікові періоди, міс.					
		0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	0–15
Українська чорно-ряба	Mтм	560 ± 6,5	646 ± 7,5	655 ± 30,1	537 ± 31,0	507 ± 14,0	555 ± 7,02
	σ	29,1	33,6	120,7	124,0	50,5	25,3
	Cv	5,1	5,2	21,7	23,0	9,9	4,56
Чорно-ряба × поліська м'ясна	Mтм	665 ± 7,8	990 ± 7,9	668 ± 27,2	463 ± 24,1	671 ± 17,7	684 ± 8,7
	σ	35,0	35,7	109,0	96,4	61,5	30,3
	Cv	5,2	3,6	16,3	20,8	9,1	4,4
Чорно-ряба × симентальська м'ясна	Mтм	663 ± 10,0	983 ± 11,7	650 ± 36,8	515 ± 25,9	694 ± 12,4	693 ± 10,9
	σ	44,9	52,5	147,3	103,6	44,7	39,3
	Cv	6,7	5,3	22,6	20,1	6,4	5,6
Чорно-ряба × українська м'ясна	Mтм	672 ± 7,8	950 ± 10,4	553 ± 20,2	491 ± 23,6	582 ± 14,6	643 ± 3,3
	σ	35,0	46,8	81,0	94,6	52,9	13,2
	Cv	5,1	4,9	14,6	19,2	9,0	2,06
Чорно-ряба × волинська м'ясна	Mтм	647 ± 7,29	920 ± 4,4	558 ± 22,9	455 ± 20,0	731 ± 16,1	655 ± 4,3
	σ	32,6	20,1	91,7	80,2	58,3	15,6
	Cv	5,0	2,1	16,4	17,6	7,9	2,3

Якщо середньодобові приrostи від народження до 15-місячного віку в чорно-рябих тварин становлять 555±7,02 г, то у помісей — 643±3,3 — 693±10,9 г.

Браховуючи, що у м'ясному скотарстві зовнішні форми тварин безпосередньо пов'язані з їхніми продуктивними якостями, показники екстер'єру набувають особливого значення.

Наведені у табл. 2 основні проміри статей тіла піддослідних тварин у 15-місячному віці свідчать про переваги помісей у таких показниках, як ширина, глибина, обхват грудної клітки, напівобхват заду, які характеризують м'ясні якості тварин.

2. Проміри статей тіла тварин у 15 міс., см

Порода, породне поєдання	Висота в холці	Коса довжина тулуба	Грудна клітка			Напівобхват заду	
			обхват	ширина	глибина		
Українська чорно-ріяба	M±m	117,9 ± 0,39	123,2 ± 1,58	157,8 ± 0,87	38,3 ± 0,57	58,4 ± 0,47	92,3 ± 0,70
	σ	1,47	4,76	2,62	1,73	1,42	2,12
	Cv	8,2	3,8	1,6	4,5	2,4	2,2
Чорно-ріяба × поліська	M±m	119,5 ± 0,57	127,0 ± 0,37	163,0 ± 1,13	42,8 ± 12,88	61,8 ± 4,88	100,8 ± 1,21
	σ	1,51	1,0	3	1,46	0,90	3,24
	Cv	1,2	0,8	1,8	3,5	1,4	3,2
Чорно-ріяба × симентальська	M±m	120,1 ± 1,01	129,8 ± 0,87	167,6 ± 2,73	42,3 ± 0,80	63,6 ± 0,71	106,5 ± 0,84
	σ	2,48	2,13	6,68	1,96	1,75	2,07
	Cv	2,0	1,6	3,9	4,6	2,7	1,9
Чорно-ріяба × українська	M±m	118,2 ± 0,56	122,7 ± 1,0	163,0 ± 1,38	41,0 ± 0,57	60,0 ± 0,53	98,7 ± 0,67
	σ	1,49	2,81	3,65	1,52	1,41	1,79
	Cv	1,2	2,2	2,2	3,7	2,3	1,8
Чорно-ріяба × волинська	M±m	117,4 ± 0,24	121,2 ± 0,64	164,8 ± 1,04	42,1 ± 0,78	63,2 ± 0,82	102,2 ± 0,36
	σ	0,72	1,92	3,14	2,36	2,48	1,09
	Cv	0,6	1,5	1,9	5,6	3,9	1,0

Для вивчення м'ясних якостей проведено контрольний забій піддослідних бугайців (табл. 3).

3. Забійні якості бугайців різних генотипів у 12,5-місячному віці

Показники	Порода, породне поєдання				
	Ч/P	1/2PM × 1/2Ч/P	1/2CM × 1/2Ч/P	1/2UM × 1/2Ч/P	1/2BM × 1/2Ч/P
Передзабійна					
живча маса, кг	212±5,6	273±2,9	289±27,1	251±20,0	245±2,5
Маса туши, кг	107±1,2	149±3,2	157±15,1	139±9,3	135±0,2
Вихід туши, %	50,4±1,29	54,5±1,73	54,3±0,23	55,3±0,67	55,1±0,47
Забійна маса, кг	110±1,0	153±3,2	160±15,5	143±10,7	138±0,3
Забійний вихід, %	51,8±1,37	56,0±1,79	55,3±0,40	56,9±0,30	56,3±0,60

Аналіз даних табл. 3 показує, що за забійним виходом помісні тварини переважають ровесників чорно-ріябої породи. Забійний вихід від помісей української м'ясої породи становить 56,9%, волинської м'ясої — 56,3, поліської м'ясої — 56,0, симентальської м'ясої породи — 55,3 проти 51,8% у тварин української чорно-ріябої породи.

Висновки. Використання плідників поліської, симентальської, української, волинської порід є ефективним для промислового скрещування з чорно-рябою породою. Одержані помісі першого покоління можуть слугувати доброю материнською основою для кросбредного розведення при створенні стад м'ясного напряму продуктивності на Поліссі.

Інститут розведення і генетики тварин УААН

Эффективность сочетания мясных пород при скрещивании с чёрно-пёстрым скотом на Полесье. В.П. Ткачук. Институт разведения и генетики животных УААН.

Резюме. Изложены результаты исследований эффективности сочетания мясных пород при скрещивании с черно-пестрым скотом на Полесье.

The efficiecy of the combination of beef breeds at crossing with black-and-white cattle in Wooded district. V.P. Tkachuk Institute of animal breeding and genetics UAAS.

Summary. The results of investigation of the efficiency of combination of beef breeds at crossing with black-and-white cattle in Woded district are proposed.