

УДК 636.234.1.061.034

Т.П. ШКУРКО

Інститут тваринництва центральних районів УААН

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКСТЕР'ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження акліматизації імпортної голштинської худоби німецької і голландської селекції та їхніх дочок в умовах одного господарства. Установлено, що в процесі акліматизації краї показники мали тварини німецької селекції.

Голштини, екстер'єр, продуктивність, жива маса, нащадки

Відомо, що адаптаційні особливості тварин взаємозв'язані з їхнім екстер'єрно-конституційним типом. Тому вивчення екстер'єрно-конституційних особливостей худоби в багатьох дослідженнях ґрунтуються на зв'язку між зовнішніми формами тіла тварин з їхньою продуктивністю та тривалістю господарського використання [1-6].

Установлено, що висота в холці, обхват грудей і п'ястка мають позитивний зв'язок із тривалістю господарського використання та пожиттєвою продуктивністю. Це свідчить про зміну типу тварин, що в свою чергу супроводжується зміною продуктивності [7].

Удосконалення продуктивності голштинської худоби впродовж багатьох років проводили одночасно з інтенсифікацією селекції за екстер'єрно-конституційними якостями. В результаті отримано неперевершену за надоями молочну породу, яка характеризується міцною конституцією і пристосованістю до умов промислової технології.

Особливо значного ареалу поширення ці племінні тварини набули на Дніпропетровщині. Закупівлю голштинського поголів'я проводять у країнах Західної Європи (Голландії, Данії,

© Т.П. Шкурко, 2005

Розведення і генетика тварин. 2005. Вип 39.

Німеччині, Угорщині та ін.). Долаючи стрес при перевезенні і психологічні фактори, тварини потрапляють під вплив нової системи утримання, зміни раціону, в специфічні місцеві кліматичні й екологічні умови. Шоб освоїти нове середовище, організм уже повинен мати ознаки, які робили б його життєздатним в нових умовах або мати відповідні перспективні функції, що могли б реалізуватися. Надходження масиву голштинської худоби різного походження в умови одного господарства дає змогу вивчити і прогнозувати різні тенденції реалізації господарських корисних ознак у процесі акліматизації, оцінювати конкурентоспроможність їх та структурних одиниць.

Метою наших досліджень було вивчення продуктивних і екстер'єрних особливостей імпортної голштинської худоби та їхніх дочок у процесі адаптації до нових кліматичних і технологічних умов.

Методика досліджень. Дослідження проведено на п'яти групах імпортних голштинських корів та їхніх дочок при прив'язній технології за однакових умов утримання, годівлі й додання на базі племзаводу "Чумаки". Оцінку молочної продуктивності, екстер'єру проводили загальноприйнятими в зоотехнії методами. Для оцінки відносної швидкості росту використовували формулу С. Броді [8]. Матеріали було оброблено біометрично за М.О. Плохінським [9].

Результати дослідження. Імпортні корови німецької і голландської селекції характеризуються добрим розвитком, мають глибокі та широкі груди, довгий тулуб і широкий зад (табл. 1).

Імпортна голштинська худоба німецької селекції відрізнялась від груп голландської селекції дещо меншою шириною грудей і більшою шириною в клубах та обхватом п'ястка і характеризувалась вищим індексом костистості. Завезені групи тварин голландської селекції мали майже одинаковий розмах за величиною промірів, що свідчить про спрямованість селекційного процесу із створення тварин з гармонійною будовою тіла.

Соматометричні показники екстер'єру корів-первісток першої еколо-генетичної генерації від імпортних голштинів німецької селекції були вірогідно значно вищі, ніж у матерів, крім ширини в клубах. Зросли індекси збитості та грудний.

Нащадки голштинів голландської селекції I і II груп за основними промірами, такими як висота в холці, глибина грудей,

I. Статистична характеристика інформації золотомісивих корів-первісок та їхніх біонок

Показник	Група по джерелу				III - романійські свінки (осінь 1993 р.), n = 38				IV - романійські свінки (весна 1993 р.), n = 7			
	І - відмінної якості (зір 1991 р.), n = 23		І - середньої якості (зір 1991 р.), n = 21		ІІ - поганої якості (весна 1993 р.), n = 38		ІІІ - поганої якості (осінь 1993 р.), n = 7		ІV - поганої якості (весна 1994 р.), n = 21		ІV - поганої якості (осінь 1994 р.), n = 4	
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
Вага в 3 роки	131,78±0,84 ^a	135,04±2,68	133,01±5,84	131,24±5,63	132,58±0,50	132,39±0,25	139,93±0,68	133,39±0,73	132,98±0,73	132,00±2,21		
Грудний пр.20%	67,17±6,34	69,52**±2,83	71,49±6,83	67,62**±5,76	71,43±6,51	68,90***±0,35	69,96±6,91	69,57±0,48	67,63±0,74	69,27±0,32		
Лікарінко F25,24%	40,45±6,87	41,15***±6,21	45,48±6,86	44,43±6,72	45,66±0,54	46,80±6,41	46,57±1,23	46,09±1,23	42,61±0,45	45,43±0,49		
Щерстя в	53,91±0,68	52,39±0,65 ^b	56,76±0,60	48,57±4,69	51,43±6,32	50,99***±0,37	50,67±0,94	50,71±0,78	49,81±0,62	50,09±0,55		
Макроанал.												
Коса з довжиною тульди	153,42±0,94	154,34±4,03	155,24±1,43	151,63±1,42	154,32±0,93	155,28±0,64	152,36±1,94	160,51**±1,97 ^b	152,67±3,98	158,96±2,54		
Обхват гр.2,5%	182,56±4,90	198,39***±2,12	202,81±2,08	186,29***±1,69	201,53±1,43 ^b	190,28***±1,94	194,21±1,86	193,71±1,48	191,88±1,38	198,81±1,71		
Осадж. і скло	26,52±0,22	19,52***±0,12	18,96±0,36	19,24±0,17	19,79±0,09	19,53±0,10	19,06±0,07	19,36±0,14	19,35±0,12	19,24±0,09		
	<i>Біоценоз мікробіологічна, %</i>											
Бактеріальний	49,63	48,13	46,25	48,48	46,12	47,96	46,64	47,81	49,11	47,54		
Роз. фітоцил.	116,49	115,44	116,71	115,53	116,40	117,29	116,37	120,47	114,80	120,38		
Грибковий	60,20	65,23	63,62	65,71	63,92	67,63	66,66	66,12	62,97	65,61		
Зоотехн.	118,95	128,01	130,64	122,86	130,59	122,54	127,47	120,64	125,68	118,82		
Хоченіч.т.	15,57	14,56	14,21	14,66	14,93	15,75	14,56	14,60	14,55	14,58		

*P > 0,95; **P > 0,99; ***P > 0,999.

ширина в клубах і обхват грудей, були меншими відносно своїх матерів, дочки III групи — більш високорослі порівняно із своїми матерями на 2,36 см ($p > 0,99$) і мали довший тулуб на 8,21 см ($p > 0,95$), в результаті чого індекс розтягнутості зріс на 4,1% і зменшився індекс збігості на 6,83%. Корови-першістки IV групи при майже однаковій висоті в холці з матерями переважали їх за розвитком грудей і мали більш видовжений тулуб.

Становлення усіх господарських ознак тварин, таких як молочність, м'ясність тощо, відбувається в результаті розвитку спадкової основи організму в конкретних умовах середовища. При цьому важливою селекційною ознакою, що визначає подальший розвиток організму, є жива маса тварин при народженні. З найвищою живою масою теляті народжувались від імпортних голландської німецької селекції, їхня середня жива маса становила $32,86 \pm 0,54$ кг. Телятка від нетелей голландської селекції народжувалась в умовах господарства із значно меншою живою масою: у I і II групах їхня середня жива маса відповідно становила $24,38 \pm 0,75$ і $23,20 \pm 0,52$ кг, у III і IV — $27,75 \pm 1,44$ і $27,31 \pm 0,52$ кг. Наведені дані свідчать, що у імпортних нетелей голландської селекції I і II груп, завезених на початку зимового і весняного сезонів року, пристосованість у процесі акліматизації відбувається повільше.

Раціональна спрямованість вирощування ремонтного молодняку в господарстві сприяла нормальному його розвитку, формуванню у тварин міцної конституції та високої продуктивності. Середня жива маса телят у 18-місячному віці відповідно по групах становила: I група німецької селекції $422,76 \pm 4,78$ кг; I група голландської селекції $403,05 \pm 5,61$ кг; II група — $410,94 \pm 3,36$; III — $412,62 \pm 10,76$; IV — $442,10 \pm 4,57$ кг. Водночас слід зазначити, що телята з меншою живою масою при народженні швидше рости, особливо у віковий період до шести місяців (табл. 2).

При вивченні взаємозв'язку живої маси тварин з продуктивністю встановлено, що корови-першістки першої сколото-генетичної генерації I групи німецької селекції та I групи — голландської за живою масою і молочною продуктивністю вірогідно перевищували своїх матерів (табл. 3). Так у I групі німецької селекції з підвищенням живої маси на 5,3% молочна продуктивність зросла на 12,8%, у I групі голландської селекції —

2. Відносна швидкість росту телятів першої еколо-генетичної генерації, %

Групи	Вікові періоди			
	від народження – 6 міс.	6 міс. – 12 міс.	12 міс. – 18 міс.	від народження – 18 міс.
<i>Німецька селекція</i>				
I	144,98	42,08	28,87	171,15
<i>Голландська селекція</i>				
I	152,80	48,45	29,70	177,18
II	153,23	52,26	31,46	178,62
III	144,88	51,24	33,82	174,79
IV	146,36	52,27	37,93	176,73

відповідно на 6,9 і 19,8%, у II групі голландської селекції — на 5,2 і 4,2%. Дочки III і IV груп, матері яких вирізнялися великою живою масою, — відповідно $547,14 \pm 12,76$ і $548,50 \pm 9,58$ кг і мали найвищу молочну продуктивність порівняно із своїми імпортними ровесницями — $5753,71 \pm 207,98$ і $5545,45 \pm 261,45$ кг молока, поступалися їм за даними показниками.

Для визначення спрямованості й величини взаємозв'язку надій — жива маса було вирахувано коефіцієнти кореляції. Установлено невисоку позитивну залежість між надоєм і живою масою у голштинів німецької селекції: коефіцієнт кореляції становив у матерів + 0,214 і у дочок + 0,274. Серед груп

3. Молочна продуктивність і жива маса імпортних голштинських корів та їхніх дочок за першу лактацію

Групи	Середня жива маса, кг		Середній надій за 305 днів, кг	
	М	Д	М	Д
<i>Німецької селекції</i>				
I	$504,41 \pm 7,40$	$530,95 \pm 7,33^{**}$	$5085,59 \pm 124,49$	$5736,10 \pm 164,16^{**}$
<i>Голландської селекції</i>				
I	$502,05 \pm 9,01$	$536,54 \pm 7,91^{**}$	$5066,96 \pm 149,50$	$6032,77 \pm 347,48^{*}$
II	$508,40 \pm 9,93$	$534,83 \pm 6,08^{*}$	$5391,33 \pm 138,24$	$5618,12 \pm 189,75$
III	$547,14 \pm 13,76$	$542,43 \pm 12,94$	$5753,71 \pm 207,98$	$5268,14 \pm 163,53$
IV	$548,50 \pm 9,58$	$523,27 \pm 5,94$	$5545,45 \pm 261,75$	$5405,77 \pm 287,45$

*P > 0,95; **P > 0,99

голштинів голландської селекції позитивний зв'язок між даними ознаками спостерігався у тварин IV групи: коефіцієнт кореляції у матерів становив + 0,352 і у дочок + 0,492. Досить на високому рівні взаємозв'язку зміна цих ознак відбувається у нашадків III групи імпортних голштинів: коефіцієнт кореляції становить + 0,629, у матерів залежність цих показників була незначною і від'ємною — 0,196. У I і II групах тварин як у матерів, так і у дочок взаємозв'язок цих ознак був незначний і рівного спрямування.

Висновки. Результати досліджень показують, що голландська худоба німецької і голландської селекції має добру акліматизовану здатність до умов Степу України і характеризується вираженим молочним типом за соматометричними показниками екстер'єру і високим генетичним потенціалом продуктивності. Однак при цьому слід зазначити, що в процесі акліматизації кращі показники мали тварини німецької селекції. У дочок голштинів I і II груп голландської селекції, які мали при народженні низьку живу масу, в процесі вирощування спостерігається висока відносна швидкість росту. У першу лактацію їхня жива маса була близька до маси їхніх однолітків.

1. Екстер'єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків та ін.; За ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович. - К. : Науковий світ, 2001. - 146 с.
2. Brotherstone S. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and production traits in holstein-riesian dairy cattle // Anim. Prod. - 1994. - V.59. - P.183-187.
3. Factor analysis for evaluating relationships between first lactation type scores and production data of holstein dairy cows / M. Sieber, A.E. Freeman, P.N. Hinz // J. Dairy Sci. - 1987. - V.70, N 5. - P. 1018-1026.
4. Genetic correlations between lifetime production and linearized type in Canadian Holsteins / D.G. Klassen, H.G. Monardes, L. Jairath at el. // J. Dairy Sci. - 1992. - V.75, N8. - P. 2272-2282.
5. Relationships between sire genetic evaluations for conformation and functional herd life of daughters / J. C.M. Dekkers, L.K. Jairath, B.N. Lawrence // J. Dairy Sci. - 1994. - V.77, N3. - P. 844-854.
6. Хмельничий І. Характеристика корів бажаного типу за продуктивністю та екстер'єром // Тваринництво України. - 2003. - № 7. - С.17-19.

7. Пешук Й. Оптимальные сроки использования молочных коров // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 1. – С.22-23.
8. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. – К.: Аграрна наука, 1999. – 512с.
9. Плохинський Н.Л. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 256 с

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛШТИНСКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ СТЕПИ УКРАИНЫ.
Т.П. Шкурко

Приведены результаты исследований акклиматизации импортного голштинского скота немецкой и голландской селекции и их дочерей в условиях одного хозяйства. Установлено, что в процессе акклиматизации лучшие показатели имели животные голштинской селекции.

Голштины, экстерьер, продуктивность, живая масса, потомки

EFFICIENCY AND EXTERRIERIAS OF FEATURE GOLSHTINIANS OF CATTLE IN CONDITIONS OF STEPPE OF UKRAINE.
T.P. Shkurko

The results of researches of acclimatization import golshtinian of cattle of German and Dutch selection and their daughters in conditions of one facilities economy are given. Is established, that during acclimatization the best parameters had animal golshtinian of selection.

Holsteins, exterrier, efficiency, alive weight, posterity