

Для удосконалення ліній немале значення має підбір до її продовжувачів неспоріднених свиноматок. Вони повинні володіти цінною спадковістю і водночас відповідати типу лінії за основними якісними особливостями. Висока якість цих свиноматок і внесена ними частка спадковості їхніх видатних предків доповнюють лінію новими цінними ознаками, збільшують накопичення в них заводського "капіталу", дають можливість одержувати потомство ще більш цінне, ніж сам родоначальник, а отже, сприяють подальшому прогресу лінії.

Як відомо, спарювання тварин однієї лінії з тваринами іншої прийнято називати кросом. При цьому цінні якості однієї лінії, доповнюючи якості іншої, збагачують у своєму поєднанні спадковість потомства. Нерідко при кросах ліній спостерігаються такі поєднання, які забезпечують гетерозисний ефект. Звичайно, найвидатніших за продуктивними якостями тварин і одержують у результаті вдалих кросів ліній. Крім того, що міжлінійні кроси сприяють підвищенню продуктивності та поліпшенню інших господарських ознак тварин, вони мають також і формоутворювальне значення, даючи початок новим цінним лініям.

УДК 636.4.082.251

М.Д. БЕРЕЗОВСЬКИЙ

*Інститут свинарства ім. О.В.Кvasницького УАН*

## ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ СВІНЕЙ ЗА ЛІНІЯМИ

*Розведення свінів за лініями основано на використанні в породі видатних плідників та їхнього потомства для створення високопродуктивної і спадково стійкої групи тварин, які вирізняються якостями, необхідними для даного етапу розвитку свинарства.*

У вітчизняній літературі розведення за лініями трактується як вища форма селекційної роботи. Селекціонери в заводських стадах праґнуть розділити тварин на певні групи, лінії, щоб краще комбінувати їх на поєднаність як в чистопородному розведенні, так і в

© М.Д. Березовський, 2005

Розведення і генетика тварин. 2005. Вип. 38

схрещуванні. Однак до традиційних понять ліній за останні роки додалося багато нових і питання значно ускладнилося.

Нині у свинарстві можна назвати декілька лінійних структур. Класифікація за генеалогічним принципом ґрунтується на наявності родонаочальника і ступеня його віддаленості від існуючих ліній тварин. Розрізняють *генеалогічні* лінії кнуров і родини свиноматок, коли родонаочальник або родонаочальниця знаходяться у віддаленому ряді предків. Наприклад, у великий білій породі свиней — лінії Леопарда, Драчуна, Свата; родини — Волшебниці, Чорної Птички, Сої та ін. іменуються в породі за кличками без назви, номера конкретного родонаочальника. Ці генеалогічні лінії використовуються, головним чином, для систематики породи, оскільки аналіз їх дає змогу робити висновок про походження і родинні зв'язки тварин.

У межах генеалогічних ліній і родин виокремлюють *заводські лінії* кнуров і родини свиноматок, у котрих родонаочальник і родонаочальниця перебувають не далі 4—5-го ряду предків. Такі групи називають за кличками і номером родонаочальника (лінія Драчуна 8435, родина Волшебниці 1988). Вони існують у стаді або породі до тих пір, поки зберігається вплив родонаочальника (3—5-го покоління), а потім змінюються новими. При цьому важливо вчасно зафіксувати ослаблення впливу старого родонаочальника і виокремити нового. При роботі з заводськими лініями великий інтерес представляє метод кільцовання [3], згідно з яким від кнура-родонаочальника виокремлюють двох синів. Одного спаровують з однією групою свиноматок, а другого — з іншою, неспорідненою з першою. А відтак лінію ведуть по двох гілках до 3—4-го покоління, а потім свиноматок однієї гілки спаровують з кнурами другої (замикають кільце) і серед їхнього потомства виокремлюють нового родонаочальника. Таким чином, має місце комбінований взаємний вплив спарованих тварин двох ізольованих гілок з використанням помірного інбридингу (спільній родонаочальник в обох гілках залишається в III—IV рядах предків), збільшується вірогідність отримати видатних тварин як нових родонаочальників.

В останні роки наведена лінійна структура піддається серйозній критиці, яка зводиться до наступного. Заводські лінії і родини в стадах малочисленні, а тому розводити їх “у собі” неможливо. Тому в практиці їх безперервно схрещують між собою, а відтак тварини будуть якої лінії несуть у собі кров свиней багатьох інших ліній і споріднених груп. Стає важко розрізняти їх не тільки за зовнішніми формами

ти, але їй продуктивністю. Втрачається генетична різноманітність і лінії стають формальними (відрізняються лише за кличками).

Враховуючи вищепередне щодо розведення ліній і родин, останнім часом заслуговує уваги таке поняття, як лінія в розмірі цілого стада. А це є не що інше, як заводський тип свиней. Менш вдалим слід вважати називу лінія — популяція, запропоновану В.М. Федориновим [5], оскільки поняття популяції в біологічному і зоотехнічному розумінні набагато ширше, ніж одне стадо в породі. Пропозиція вважати окреме стадо як лінію породи заслуговує серйозної уваги. Стадо 200–250 голів основних свиноматок можна тривалий період часу розводити ізольовано від інших стад без вимушеної інбридингу і селекціонувати у відповідному напрямі.

У більшості селекційних стад України кількість свиноматок на даний період суттєво скоротилася і це стосується, перш за все, локальних та м'ясних порід, у яких маточне поголів'я не перевершує 100 голів. Тому для ефективної роботи щодо створення заводських типів необхідно об'єднувати селекційні програми окремих племзаводів з їхніми дочірніми господарствами, котрі в більшості представлено кращими племрепродукторами. Наприклад, згідно з Програмою селекції великої білої породи на 2003–2012 роки за кожним племзаводом закріплено дочірні стада, які повинні працювати спільнотою і цілеспрямовано обмінюватись селекційним матеріалом, особливо представниками кращих заводських ліній кнурів.

За рівнем і напрямом продуктивності *заводські типи* можуть бути комплексними (відселекціоновані за комплексом ознак) і спеціалізованими (відселекціоновані за однією або групою ознак, що корелюють між собою), а за походженням — чистопородними і синтетичними. За даними Ю.В. Лебедєва [4], заводські типи можна поділити на 4 групи: I комплексні — чистопородні; II комплексні — синтетичні; III спеціалізовані — чистопородні; IV спеціалізовані — синтетичні.

Створення ліній (заводських типів) здійснюється при роботі з цілим стадом свиней і практично це неможливо у вигляді окремих груп тварин. Спроби селекціонувати одну, другу, третю (і більше) частини стада в різних напрямах практично неможливо в організаційному відношенні, оскільки важко вести селекцію з малою групою взагалі і ще важче виключити спаровування тварин різних груп в одному стаді. Разом з цим у заводському типі зберігаються заводські лінії і споріднені групи, кроси яких забезпечують неспоріднене розведення тривалий час.

Наочним прикладом спеціалізації селекції з урахуванням лінійної структури племінних стад є удосконалення великої білої породи в Україні. При цьому кінцевою метою є створення спеціалізованих типів: на першому етапі заводських і на другому — об'єднання заводських у внутріпородні. Роботи в цьому плані виконуються впродовж останніх 28 років. Результатом селекції є створення і апробація внутріпородного (УВБ-1) і в його складі трьох заводських типів з високими материнськими якостями, внутріпородного проміжного батьківського типу з високими відгодівельними якостями — УВБ-2 (в його складі двох заводських типів) і завершується робота із створення проміжного батьківського типу з поліпшеними м'ясними якостями — УВБ-3 [1, 2]. Загальну генеалогічну структуру великої білої породи свиней наведено на рисунку. При цьому у селекційному процесі задіяно базові племзаводи та їхні дочірні стада. Стосовно до решти племінних господарств (ферм), то в них селекція ведеться за комплексом ознак (незалежним рівням) і масово застосовується кросування різних генеалогічних і заводських ліній з родинами та спорідненими групами свиноматок.

Останнім часом докорінно змінюється відношення до генеалогічної структури нуклеусних стад у країнах із розвиненим свинарством. Наприклад, в Англії, Данії, Німеччині та ін. не практикується віднесення тварин до генеалогічних чи заводських ліній. У даному разі ту чи іншу лінію представляє в цілому племінне стадо, а показниками відбору і добору є відсутність спорідненості при поєднанні кнурів і свиноматок, а також рівень їхньої продуктивності за селекційним індексом.


Таким чином, основними генеалогічними структурами в породах свиней, у першу чергу широкого ареалу розповсюдження, є заводські типи, в складі яких використовуються кроси заводських ліній кнурів та родини свиноматок. Після апробації двох і більше заводських типів аналогічного напряму продуктивності їх об'єднують у внутріпородні типи і вивчають на поєднаність з іншими генотипами у системах гібридизації.

1. Березовський М.Д. Стан і перспективи селекції свиней великої білої породи в Україні // Вісн. аграр. науки. — 1999. — С. 49–51.

2. Березовський М.Д., Хатъко I.В., Нагаевич В.М. Випробування спеціалізованих типів свиней великої білої породи // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2004. — С. 30–32.

3. Козловский В.Г. Система разведения свиней и организация племен-

Загальна генеалогічна структура великої білої породи



ной работы при индустриализации свиноводства. -- Л.: Агропромиздат, 1985. -- С. 22-27.

4. Лебедев Ю.В. Улучшение пород свиней. -- М.: Россельхозиздат, 1978. -- 106 с.

5. Федоринов В.М. Взаимосвязь и взаимообусловленность линий породы: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. -- М., 1960. -- 30 с.

**УДК 636.4.082**

**С.В. АКІМОВ**

*Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН*

## **МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ**

*Матеріал статті висвітлює особливості створення заводських ліній центрального типу української м'ясої породи та їхнього подальшого розвитку шляхом внутріпорідних поєдань тварин заводських типів породи і прилиття крові свиней датського ландрасу.*

### **Лінія, тип, контрольне вирощування і відгодівля, оцінка**

**Матеріал і методика дослідження.** Селекційно-племінна робота із створення центрального типу (ЦТ) української м'ясої породи полтавської селекції проводилася на основі відтворного схрещування свиней полтавського м'ясного типу (ПМ-1) з тваринами білоруської спеціалізованої лінії (БС) в період 1981-1992 рр. З 1982 р. було розпочато формування генеалогічної структури типу. Селекційним матеріалом для цього були тварини, генотип яких містить 3/4 частки крові свиней полтавського м'ясного типу. Родонаочальниками нових ліній і родин обиралися особини, яких було оцінено за власною продуктивністю, якістю нашадків та які мали рекордні показники. Декотрих з них оцінено за здатністю перетравлювати поживні речовини корму і засвоювати його азотисту частину.

Створення ліній проводилося за методикою А.І. Овсяннікова (1970) [1]. Отінку відгодівельних і м'ясних якостей здійснювали згідно з існуючими ОСТами (102-86, 103-86). Фізіологічні досліджен-

© С.В. Акімов, 2005

Розведення і генетика тварин. 2005. Вип. 38