

НОЙ Х УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ТИПА КОНСТИТУЦИИ. Федак В.Д., Федак Н.М., Дяченко О.Б., Кулиш Л.М.

Наведены данные физиологических и биохимических показателей крови помесных бычков разного типа конституции.

Тип конституции, физиологические и биохимические показатели крови, бычки, украинская чёрно-пестрая молочная порода, украинская мясная порода

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF A BLOOD BREEGING BULLS UKRAINIAN BLACK-MOTLEY LACTESCENT × UKRAINIAN MEAT BREEDS A DIFFERENT TYPE OF THE CONSTITUTION. Fedak V., Fedak N., Djachenko O., Kulish L.

The data of physiological and biochemical parameters of a blood breeging bulls a different type of the constitution.

Type constitution, physiological and biochemical parameters of a blood, bulls, Ukrainian black-motley lactescent breed, Ukrainian meat breed

УДК 636.02.082.32:612.664

Є.І. ФЕДОРОВИЧ, Н.М. БАБІЙ*

Інститут біології тварин УААН

*Інститут розведення і генетики тварин УААН**

ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ХУДОБИ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Викладено результати дослідження якісних показників молока корів чорно-рябої худоби різної селекції впродовж лактації. Установлено кореляційні зв'язки між величиною їхнього надою та хімічним складом молока.

Селекція, надій, жир, білок, суха речовина СЗМЗ, лактоза

Молоко є біологічною рідиною складної хімічної будови, яка виділяється молочною залозою самок ссавців. Вона є повноцінним і незамінним кормом для новонароджених тварин, а

© Є.І. Федорович, Н.М. Бабій, 2008

Розведення і генетика тварин. 2008. Вип. 42.

також необхідним продуктом харчування для людей різного віку. В молоці містяться повноцінні білки, жири, цукор, мінеральні речовини, вітаміни і ферменти в такому співвідношенні, яке потрібне для підтримання нормальної життєдіяльності людського організму. Всі його складники засвоюються організмом людини майже повністю. Молоко також сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, які надходять в організм з іншими продуктами харчування [1, 5, 6, 8, 12, 13, 15]. Ряд дослідників відзначають, що цілеспрямовану селекцію корів необхідно вести одночасно з урахуванням трьох основних ознак – надою, жиру та білка, – які успадковуються незалежно один від одного [4, 14]. Установлено, що взаємозв'язок між складовими компонентами молока і надоєм у високопродуктивних корів чорно-рябої худоби залежить від періоду лактації й має різне значення [3, 12, 13].

Поліпшити якість молока можна шляхом збільшення у ньому вмісту жиру і білка. Дослідженю якісного складу молока присвячено чимало праць, проте ця проблема нині знову набуває актуальності у зв'язку із створенням в Україні нових порід та типів великої рогатої худоби. Саме тому нами було досліджено якісні показники молока корів чорно-рябої худоби різної селекції.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили у племепропродукторі "Правда" Бродівського району Львівської області на чорно-рябих коровах різної селекції. Для цього було сформовано методом аналогів чотири групи повновікових корів різної селекції (української, голландської, західно- та східнонімецької) по 6 голів у кожній.

Молочну продуктивність оцінювали на основі проведених контрольних надоїв за дві суміжні доби (обід, вечір і ранок). Якість молока визначали згідно з ГОСТом – 13928-84. Хімічний склад молока визначали на 2–3, 5–6, 8–9-му місяцях лактації. Вміст жиру в молоці визначали за методом Гербера, загальний білок та казеїн – формольним титруванням, вміст лактози, сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) – рефрактометрично, суху речовину – висушуванням у сушильній шафі [2, 7, 9]. Біометричну обробку одержаних результатів досліджень проводили за методикою М.О. Плохінського [11] з використанням комп'ютерної програми STATISTICA-6.

Результати досліджень. Нами встановлено, що добові надої корів зарубіжної селекції були майже однакові і знаходились у межах 20,4–21,0 кг на другому–третьому, 13,7–14,0 – на п'ятому–шостому, 10,2–11,2 – на восьмому–дев'ятому місяцях лактаційного періоду та 15,0–15,3 кг – в середньому за лактацію (табл. 1). Корови голландської, західно- і східнонімецької селекції невірогідно переважали аналогів української селекції за вищезазваним показником на 2–3-му місяці лактації відповідно на 1,3; 1,0 і 0,7 кг, на 5–6-му – на 1,8; 1,5 і 1,7, на 8–9-му – на 1,5; 0,5 і 1,3, а в середньому за лактацію – на 1,4; 1,1; 1,2 кг. Середньодобові надої корів усіх дослідних груп до кінця лактаційного періоду знижувалися. Коефіцієнт мінливості надою коливався від 9,1 до 28,3%, середнє квадратичне відхилення – від 1,722 до 5,556. За вмістом жиру в молоці корови зарубіжної селекції в досліджувані періоди лактації суттєво не різнилися. Дещо нижчою жирномолочністю характеризувалися тварини української селекції. На 2–3-му місяці лактації вони поступалися за цим показником аналогам голландської селекції на 0,04, західнонімецької – на 0,06 та східнонімецької – на 0,01, на 5–6-му місяці – відповідно на 0,13; 0,11 і 0,06, на 8–9-му місяці – на 0,10; 0,15 і 0,08 та в середньому за лактацію – на 0,10; 0,11 і 0,08%. Результати наших досліджень показують, що на 2–3-му місяці лактації найвищий вміст жиру в молоці був у тварин західнонімецької селекції, на 5–6-му місяці – у голландської і на 8–9-му місяці – у східнонімецької селекції. Необхідно відмітити, що цей показник у молоці корів упродовж лактації зростав. Коефіцієнт мінливості цієї ознаки був у межах 1,1–5,1%, а середнє квадратичне відхилення – в межах 0,114–0,193.

Вміст білка у молоці в усі досліджені періоди найвищий був у корів вітчизняної селекції. Тварини голландської, західно- і східнонімецької селекції за цим показником поступалися аналогам української селекції на 2–3-му місяці лактаційного періоду на 0,05; 0,08 і 0,07, на 5–6-му місяці – на 0,05; 0,06 і 0,12, на 8–9-му місяці – на 0,06; 0,08 і 0,09 та в середньому за лактацію – на 0,05; 0,08 і 0,10% відповідно. Аналогічна картина спостерігалася і за вмістом казеїну (виняток – 5–6-й місяць лактації). За вмістом білків сироватки молока між тваринами різної селекції у досліджувані періоди суттєвої різниці не вияв-

I. Хімічний склад молока по місяцях лактації ($n=6$, $M \pm m$)

Селекція	Добовий надій, кг	жир	білка	Вміст у молоці, %			жир + білок	Вміст на 100 г хиру, г
				казеїну	білків	сироватки		
2–3 місяці лактації								
Українська	19,7±0,7	3,64±0,07	3,32±0,06	2,69±0,08	0,60±0,06	4,67±0,04	12,32±0,10	8,67±0,07
Голландська	21,0±0,8	3,68±0,06	3,27±0,05	2,63±0,05	0,64±0,04	4,63±0,05	12,32±0,12	8,58±0,08
Західнонімецька	20,7±1,0	3,70±0,06	3,24±0,03	2,63±0,04	0,61±0,01	4,66±0,05	12,31±0,11	8,56±0,06
Східнонімецька	20,4±2,3	3,65±0,04	3,25±0,03	2,63±0,02	0,62±0,03	4,64±0,04	12,23±0,09	8,52±0,07
5–6 місяці лактації								
Українська	12,2±0,7	3,79±0,05	3,41±0,04	2,71±0,06	0,69±0,03	4,66±0,06	12,57±0,15	8,78±0,11
Голландська	14,0±1,2	3,92±0,06	3,36±0,04	2,71±0,05	0,65±0,04	4,64±0,06	12,63±0,12	8,71±0,09
Західнонімецька	13,7±0,7	3,90±0,07	3,35±0,05	2,66±0,04	0,67±0,03	4,67±0,04	12,63±0,11	8,73±0,05
Східнонімецька	13,9±1,4	3,83±0,05	3,29±0,04	2,66±0,06	0,62±0,04	4,61±0,03	12,48±0,07	8,58±0,08
8–9 місяці лактації								
Українська	9,7±1,1	3,96±0,06	3,43±0,06	2,74±0,07	0,68±0,05	4,72±0,06	12,85±0,16	8,89±0,12
Голландська	11,2±0,7	4,06±0,05	3,37±0,06	2,69±0,02	0,68±0,02	4,71±0,07	12,88±0,13	8,83±0,13
Західнонімецька	10,2±0,8	4,11±0,04	3,35±0,05	2,70±0,04	0,64±0,04	4,74±0,04	12,93±0,05	8,82±0,06
Східнонімецька	11,0±1,9	4,04±0,05	3,34±0,04	2,72±0,05	0,61±0,04	4,71±0,05	12,81±0,05	8,77±0,05
За лактацію								
Українська	13,9±0,6	3,80±0,04	3,39±0,04	2,72±0,06	0,67±0,03	4,68±0,03	12,58±0,10	8,78±0,07
Голландська	15,3±0,8	3,90±0,05	3,34±0,04	2,67±0,04	0,66±0,02	4,66±0,05	12,61±0,12	8,74±0,09
Західнонімецька	15,0±0,6	3,91±0,06	3,31±0,02	2,66±0,02	0,65±0,02	4,69±0,03	12,62±0,08	8,71±0,03
Східнонімецька	15,1±1,4	3,88±0,04	3,29±0,03	2,67±0,03	0,62±0,02	4,65±0,03	12,51±0,05	8,62±0,04

лено. Вміст білка у молоці впродовж лактації коливався від 3,24 до 3,43, казеїну – від 2,63 до 2,74 та білків сироватки молока – від 0,60 до 0,69%.

Протягом лактаційного періоду в молоці спостерігалося збільшення вмісту сухої речовини та сухого знежиреного молочного залишку. Так залежно від селекції тварин вміст сухої речовини в молоці зріс від 2–3 до 5–6-го місяця лактації на 2,0–2,6%, сухого знежиреного молочного залишку – на 0,7–2,0%, від 5–6 до 8–9-го місяця ці показники збільшилися відповідно на 2,0–2,6 і 1,3–2,2%, а від 2–3 до 8–9-го місяця – на 4,3–5,0 і 2,5–3,0%. Вміст лактози у всі періоди лактації у корів усіх дослідних груп змінювався незначно і був у межах 4,61–4,74%.

За сумарним вмістом жиру і білка у молоці між тваринами вітчизняної та зарубіжної селекції в досліджувані періоди значної різниці не виявлено. Встановлено, що впродовж лактації цей показник зростав. У корів української селекції сумарний вміст жиру і білка від 2–3 до 8–9-го місяця лактації зріс на 0,42, голландської – на 0,53, західнонімецької – на 0,44 та східнонімецької селекції – на 0,62%.

Найвищий вихід білка на 100 г жиру був у корів української селекції. Вони переважали ровесниць голландської, західно- і східнонімецької селекції за цим показником на 2–3-му місяці лактаційного періоду відповідно на 3,2; 4,5 ($P<0,01$) і 3,6 г ($P<0,05$), на 5–6-му місяці – на 4,2; 4,1 і 5,7 ($P<0,01$), на 8–9-му місяці – на 1,2; 5,3 ($P<0,05$) і 3,6 та в середньому за лактацію – на 2,9; 4,6 ($P<0,05$) і 4,4 ($P<0,01$).

Ми встановили, що між величиною надою та хімічним складом молока існують певні зв'язки (табл. 2). Коєфіцієнти кореляції між величиною надою та вмістом жиру в молоці у корів української та голландської селекції у розрізі лактації коливалися від невірогідно негативних до невірогідно позитивних значень, а у тварин німецької селекції вони були невірогідно від'ємними. У корів української селекції впродовж лактації цей показник був у межах -0,124 – +0,402 і за лактацію становив 0,055, голландської селекції – в межах -0,280 – +0,049 і -0,123, західнонімецької селекції – в межах -0,265 – -0,160 і -0,216 та східнонімецької селекції – в межах -0,132 – -0,109 і 0,033

2. Зв'язок між хімічним складом молока у розрізі місяців лактації та величиною надою чорно-білих корів різної селекції ($n=6$, r)

Показники посадини	Селекцій																
	Українська				Польська				західнонімецька				східнонімецька				
Показники посадини	2-3-й	5-6-й	8-9-й	за лакта- цією	3-й	2-3-й	5-6-й	8-9-й	за лакта- цією	2-3-й	5-6-й	8-9-й	за лакта- цією	2-3-й	5-6-й	8-9-й	за лакта- цією
Надій \times жир	0,402	-0,124	-0,060	0,055	-0,280	-0,232	0,049	-0,123	-0,174	-0,160	-0,265	-0,216	-0,109	-0,132	-0,119	-0,033	
Надій \times білок	-0,245	0,147	-0,359	-0,114	-0,129	-0,201	0,120	-0,060	-0,279	0,369	-0,399	-0,347	0,354	0,273	-0,299	0,353	
Надій \times казеїн	-0,336	0,439	-0,428	-0,509	0,161	-0,661	-0,049	-0,289	-0,306	-0,715	-0,69	-0,692	-0,207	0,169	-0,105	0,207	
Надій \times суха	0,024	0,106	-0,108	-0,060	-0,253	-0,244	0,114	-0,084	-0,252	0,059	-0,183	-0,308	-0,388	0,213	0,352	0,388	
речовина	-0,153	0,204	-0,011	-0,252	-0,037	-0,256	-0,250	0,116	-0,119	-0,237	0,320	0,033	-0,319	0,508	0,327	0,520	
Надій \times C3M3	-0,153	0,204	-0,011	-0,252	-0,037	-0,256	-0,250	0,116	-0,119	-0,238	0,328	-0,465	-0,278	0,126	0,384	0,099	
Надій \times жир+білок	0,017	-0,204	-0,113	-0,193	-0,187	-0,105	-0,041	-0,237	0,320	-0,237	0,320	-0,465	-0,278	0,126	0,384	0,099	
Жир \times білок	0,677	0,612	0,469	0,581	0,011	0,525	0,155	0,227	0,544	0,517	0,345	0,505	0,813*	0,575	0,627	0,813*	
Жир \times блок	0,333	0,404	0,419	0,574	0,046	0,116	0,391	0,241	0,125	0,293	0,549	0,435	0,421	0,347	0,328*	0,421	
Жир \times казеїн	0,794*	0,786	0,848*	0,800	0,087	0,701	0,389	0,581	0,785	0,552**	0,609	0,901**	0,656	0,499	0,566	0,605	
Жир \times суха	0,794*	0,786	0,848*	0,800	0,087	0,701	0,389	0,581	0,785	0,552**	0,609	0,901**	0,656	0,499	0,566	0,605	
речовина	0,591	0,360	0,654	0,561	0,339	0,350	0,043	0,217	0,375	0,432	-0,226	0,326	-0,227	-0,035	-0,319	-0,226	
Жир \times C3M3	0,862*	0,929*	0,844*	0,880*	0,538	0,936*	0,696	0,816*	0,943*	0,934**	0,901**	0,967***	0,970***	0,883*	0,902**	0,969***	
Жир \times жир+блок	0,862*	0,929*	0,844*	0,880*	0,538	0,936*	0,696	0,816*	0,943*	0,934**	0,901**	0,967***	0,970***	0,883*	0,902**	0,969***	
блок \times казеїн	0,261	0,890*	0,876*	0,675	0,682	0,924*	0,916*	0,916*	0,917**	0,043	0,307	0,804*	0,726	0,925*	0,605	0,725	
блок \times суха	0,766	0,927**	0,772	0,929**	0,781	0,966***	0,904**	0,912**	0,917**	0,849*	0,381	0,815	0,772	0,828*	0,705	0,771	
блок \times C3M3	0,704	0,940**	0,812*	0,966***	0,922*	0,969***	0,922**	0,984***	0,944**	0,944**	0,804*	0,949**	0,157	0,603	0,201	0,157	
жир+блок \times казеїн	0,957**	0,861*	0,869*	0,898*	0,849*	0,791	0,817*	0,748	0,793*	0,788	0,096	0,706	0,930**	0,892**	0,901**	0,930**	
жир+блок \times суха	0,303	0,717	0,550	0,782	0,612	0,579	0,923**	0,834*	0,725	0,269	0,956**	0,718	0,684	0,871*	0,740	0,684	
речовина	0,249	0,269	0,552	0,768	0,708	0,695	0,853*	0,884**	0,913**	0,147	0,639	0,850*	0,429	0,872*	0,047	0,429	
Казеїн \times C3M3	0,311	0,677	0,766	0,809*	0,593	0,366	0,899*	0,708	0,521	0,229	0,725	0,592	0,569	0,723	0,794*	0,569	
Сука речовина \times C3M3	0,959**	0,952**	0,956**	0,945**	0,952**	0,913**	0,937**	0,920**	0,868*	0,802*	0,635	0,704	0,638	0,848*	0,600	0,637	
Сука речовина \times жир+блок	0,842*	0,938**	0,943**	0,975***	0,980***	0,904**	0,884**	0,937**	0,989***	0,882*	0,977***	0,704	0,752	0,704	0,704	0,704	
жир+блок \times C3M3	0,718	0,799*	0,877*	0,867*	0,867*	0,956*	0,653	0,695	0,732	0,648	0,719	0,131	0,545	-0,077	0,327	-0,066	

Примітка. * $P<0,05$, ** $P<0,01$, *** $P<0,001$.

відповідно. Аналогічна картина спостерігалася і за коефіцієнтами кореляції між величиною надою і вмістом білка (виняток – східнонімецька селекція) та величиною надою і вмістом казеїну.

Позитивні зв'язки було встановлено між жиром і білком та жиром і казеїном. У корів української селекції протягом лактації коефіцієнти кореляції між вищезазначеними показниками коливалися від 0,469 до 0,677 і від 0,333 до 0,419, голландської – від 0,011 до 0,525 і від 0,046 до 0,391, західнонімецької – від 0,345 до 0,544 і від 0,215 до 0,549 та східнонімецької селекції – від 0,575 до 0,813 і від 0,347 до 0,828 відповідно. У тварин вітчизняної та зарубіжної селекції у розрізі лактації та в середньому за лактацією виявлено високі позитивні зв'язки між жиром і сухою речовиною, жиром і жиром + білок, білком і казеїном, білком і СЗМЗ, білком і жиром + білок, білком і сухою речовиною, казеїном і сухою речовиною, казеїном і СЗМЗ, казеїном і жиром + білок, сухою речовиною і СЗМЗ та сухою речовиною і жиром + білок.

Висновки. Якісний склад молока залежить від походження та рівня молочної продуктивності тварин. У перші місяці лактації незалежно від селекції тварин спостерігаються найвищі добові надої, проте вміст жиру, білка та сухої речовини в цей період найнижчий. У чорно-рябої худоби різної селекції між величиною надою та показниками хімічного складу молока встановлено різного спрямування взаємозв'язки – від низьких від'ємних до високих позитивних.

1. Барабанников Н.В. Качество молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 1980. – 24 с.
2. Біохімія молока. Практикум / Р.Й. Кравців, О.Й. Вісарик, Р.П. Параняк та ін. – Львів: Терус, 2000. – 150 с.
3. Винничук Д.Т., Омеляненко А.О., Коваленко К.С. Білковомолочність симентальських корів // Молочне і м'ясне скотарство. – 1995. – Вип. 86. – С. 8–13.
4. Гончаренко І.В. Динаміка кореляційних взаємозв'язків основних компонентів молока у корів айрширської породи та її помісей // Наук. вісн. НАУ. – 1998. – Вип.4 – С. 79–84.
5. Давыдов Р.Б. Молоко и молочное дело. – М.: Колос, 1973. – 255 с.

6. Кравців Р.Й., Хоменко В.І., Островський Я.Ю. Молочна справа. – К.: Вища шк., 1998. – 279 с.

7. Лебедев М.М., Усович А.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. – М.: Россельхозиздат, 1976. – 388 с.

8. Молоко і молочні продукти / Р.Й. Кравців, В.І. Хоменко, Я.Ю. Островський та ін. – Львів: ЛА "Піраміда", 2001. – 311 с.

9. Остапець М.Г., Романська Н.М. Практикум з біохімії. – К.: Вища шк., 1974. – 256 с.

10. Пабат В.А., Винничук Д.Т. Теоретические и практические аспекты молочной продуктивности коров. – К., 1999. – 124 с.

11. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 256 с.

12. Федорович Е.І., Сірацький Й.З. Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи: господарсько-біологічні та селекційно-генетичні особливості. – К.: Науковий світ, 2004. – 385 с.

13. Федорович Е.І. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук. – К.; Чубинське, 2004. – 38 с.

14. Ференц Л.В. Якість молока протягом лактації у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 39. – С. 200–208.

15. Van Belle M. La filiere laitiere et la sante, quelques perspectives en alimentation de la vache laitiere et la qualite nutritionnelle du lait // Ann. Gembloux. – 1996. – 102, № 3–4. – С. 87–130.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ ЧЁРНО-ПЕСТРОГО СКОТА РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ. Федорович Е.И., Бабий Н.М.

Изложены результаты исследований качественных показателей молока коров чёрно-пестрого скота разной селекции на протяжении лактации. Установлены корреляционные связи между величиной удоя и химическим составом молока.

Селекция, удой, жир, белок, сухое вещество, СОМО, лактоза

MILK CHEMICAL COMPOSITION OF BLACK-MOTTLED LIVESTOCK BREEDS OF DIFFERENT SELECTION. Fedorovich E.I., Babiy N.M.

The results of estimation of qualitative milk indexes on an extent of lactation are stated. There were established the correlation between milking quantity and chemical structure of milk in cows of different selection of Ukrainian black-mottled dairy cattle breed.

Selection, milking, milk fat, milk protein, dry matter, dry defatted milk residual (DDMR), lactose

УДК 636.02.082.454.5:591.166.1

В.В. ФЕДОРОВИЧ, Є.І. ФЕДОРОВИЧ,
Й.З. СІРАЦЬКИЙ*, І.М. ГУРСЬКИЙ**

Інститут біології тварин УААН

*Інститут розведення і генетики тварин УААН**

*Уманський державний аграрний університет***

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ

Викладено результати досліджень кількісних і якісних показників спермопродукції бугаїв-плідників різних ліній західного внутрішньопородного типу.

Бугай, лінія, об'єм еякуляту, концентрація сперміїв, загальна кількість сперміїв, рухливість сперміїв, стійкість сперміїв до заморожування, частка впливу

Відтворювальна функція є однією з найбільш важливих господарських і селекційних характеристик бугаїв-плідників. Сперма плідників характеризується значною різноманітністю

© В.В. Федорович, Є.І. Федорович,
Й.З. Сірацький, І.М. Гурський, 2008

Розведення і генетика тварин. 2008. Вип. 42.

гамет. Це зумовлено впливом генотипних і парапатипних факторів [1, 2, 6–10]. Штучне осіменіння корів і телиць глибоко замороженою спермою є дієвим методом реалізації генотипної селекції [6, 7]. Внаслідок постійного підвищення інтенсивності використання плідників виникає необхідність вивчення репродуктивної функції бугаїв різних порід, типів і ліній. Вивчення кількісних та якісних показників спермопродукції плідників різних ліній має теоретичне і практичне значення [1, 2, 6–8]. Воно дає можливість розробити організаційні й технологічні заходи щодо раціонального використання бугаїв.

Метою наших досліджень було вивчити кількісні та якісні показники спермопродукції у бугаїв різних ліній західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи.

Матеріал і методика досліджень. Динаміку кількісних і якісних показників спермопродукції плідників західного внутрішньопородного типу різних ліній вивчали за матеріалами зоотехнічного обліку та досліджень, проведених у лабораторії технології отримання і кріоконсервації сперми, на 280 бугаях, які належали Львівському обласному племоб'єднанню. Всі показники визначали згідно з ГОСТом 20909.3-75-ГОСТ 20909.6-75 та ГОСТом 27777-8 (СТ. СЄВ 5961-87). Одержані матеріал на наукових досліджень обробляли методом варіаційної статистики за М.О. Плохінським [4, 5]. Частку впливу різних ліній на показники спермопродукції вивчали методом однофакторного дисперсійного аналізу.

Результати досліджень. Нами встановлено, що у бугаїв різних ліній західного внутрішньопородного типу становлення вікової динаміки спермопродуктивності проходить неоднаково. До 2-річного віку плідників найвищі показники об'єму еякуляту ($4,04 \pm 0,20$ мл) та загальної кількості сперміїв в еякуляті ($4,08 \pm 0,26$ млрд) були у тварин лінії *П.Астронавта 1458744*, а найнижчі – у бугаїв лінії *Адеми 5113607* (відповідно $2,91 \pm 0,27$ мл і $2,56 \pm 0,34$ млрд). Різниця між плідниками вищезазначених ліній за об'ємом еякуляту становила 1,13 мл ($P < 0,01$), а за загальною кількістю сперміїв в еякуляті – 1,52 млрд ($P < 0,01$).