

УДК 636.22/28.561.469

Т.С. ЯЩУК\*, О.Я. МЕДИНСЬКА

Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН

## МОРФОЛОГІЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИМ'Я ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

*Наведено результати оцінки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за розвитком морфологічних і функціональних ознак вим'я.*

**Порода, морфологічні ознаки, функціональні особливості, вим'я**

Сучасні технології виробництва молока ставлять високі вимоги до поліпшення функціональних властивостей і морфологічної будови вим'я корів-первісток. Численною кількістю досліджень установлено зв'язок морфологічних ознак вим'я з величиною надою та придатністю корів до машинного дойння [3, 4].

Враховуючи важливе значення оцінки вим'я для визначення майбутньої продуктивності, метою наших досліджень було вивчити особливості формування якісних ознак вим'я первісток української чорно-рябої молочної породи у стадах з різним рівнем годівлі.

**Матеріали і методи дослідження.** Дослідження проводили у ПАП "Нива" ( $n = 83$ ), ПАП "Україна" ( $n = 300$ ) Підволочиського району, племгосподарстві "Шманьківчики" ( $n = 59$ ) Чортківського району. Морфологічні особливості вим'я вивчали у корів-первісток на 2-3-му місяці лакгації шляхом взяття промірів, за 1,0-1,5 год перед дойнням за допомогою мірної стрічки, циркуля, штангенциркуля та візуального обстеження згідно із зоотехнічними методиками [5].

\* Науковий керівник — доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН М.Я. Єфіменко.

Функціональні якості вим'я корів різних генотипів оцінювали за допомогою дойльного апарату для роздільного видоєвання окремих чвертей типу ДАЧ-1М. Статистичну обробку експериментальних даних проведено за алгоритмами М.О. Плохінського, за допомогою MS Excel, надбудови "Пакет аналізу", "Загальна статистика".

**Результати дослідження.** Важливою ознакою якості вим'я є його форма. Установлено, що скрещування корів з голштинськими бугаями позитивно впливає на формування бажаної форми вим'я [1, 3, 5]. Як свідчать результати досліджень, корови-первістки української чорно-рябої молочної породи у всіх господарствах мають у переважній більшості чашоподібну форму вим'я, найменша кількість первісток — з округлою формою. У тварин генотипів з високою часткою "умової" кровності за голштинською породою ( $1/8\text{ЧР} \times 7/8\text{Г}$  і  $1/16\text{ ЧР} \times 15/16\text{ Г}$ ) не виявлено додаткових дійок (табл. 1).

Однією з важливих ознак молочності вважають величину вим'я, яка характеризується шириною, довжиною, обхватом. У досліджуваних господарствах найбільша ширина вим'я була у висококровних за голштинською породою тварин у ПАП "Україна" ( $1/16\text{ ЧР} \times 15/16\text{ Г}$ ) — 33,12 см, ( $P < 0,01$ ), що на 3,77 і 2,85 см більше, ніж у ровесниць цього господарства; у ПАП "Нива" у тварин генотипу  $1/8\text{ЧР} \times 7/8\text{Г}$  — 31,86 см (на 4,01 і 3,13 см більше відповідно). З підвищенням кровності за голштинською породою лише у ПАП "Україна" дословірно підвищуються показники довжини і обхвату вим'я. У двох інших господарствах не виявлено статистичної різниці між групами за цим показником. Деяшо гірший розвиток морфологічних ознак вим'я мають тварини із стада племгосподарства "Шманьківчики".

Ми вважаємо, що ця різниця показників зумовлена в основному параптичними факторами, головними з яких є низький рівень роздою тварин і незбалансованість раціонів годівлі. Як доказ цього — низький добовий надій молока первісток у період оцінки: у тварин генотипу  $1/4\text{ЧР} \times 3/4\text{Г}$  він менший, ніж у ровесниць ПАП "Україна" того самого генотипу на 6,6 кг ( $P < 0,001$ ), але вищий на 0,9 кг, як у первісток ПАП "Нива"; у тварин генотипу  $1/8\text{ ЧР} \times 7/8\text{Г}$  — 16,3 кг, що відповідно менше

*I. Морфологічні особливості вин'я ксеро-пересутої*

Показник	Генотипи гварані					
	1 <i>W4ЧР × 3/4Г, n = 88</i>	2 <i>W4ЧР × 7/8Г, n = 135</i>	3 <i>W4ЧР "Україна"</i>	4 <i>W4ЧР × 15/16Г, n = 77</i>		
Продуктивність см.	M ± m CV, %	M ± m CV, %	M ± m CV, %	M ± m CV, %		
Довжина	39,51 ± 0,52 29,35 ± 0,44 25,58 ± 0,41 Обхват до листа	12 14 15 12	41,17 ± 0,26*** 30,27 ± 0,27 25,32 ± 0,27 131,17 ± 0,66***	7 10 13 6	42,96 ± 0,30*** 33,12 ± 0,34*** 24,13 ± 0,31 134,75 ± 0,9***	6 8 11 6
Ширина						
Глибина передніх інвертей						
Довжина зілля:						
передніх	5,54 ± 0,12 5,02 ± 0,14	25 27	5,7 ± 0,11 5,2 ± 0,11	23 25	5,81 ± 0,17 5,01 ± 0,16	25 28
задніх						
Довжина зілля:						
передніх	2,28 ± 0,04 2,27 ± 0,04	15 15	2,33 ± 0,02 2,22 ± 0,02	11 12	2,25 ± 0,03 2,2 ± 0,03	13 13
задніх						
Відстань між двома вічками						
до підлоги	64,31 ± 0,78	11	65,63 ± 0,19	3	65,00 ± 0,28	4
форма андроціїв:						
вінчикоподібна	63,8	-	65,93	-	66,23	-
шапинкоподібна	21,25	-	22,2	-	18,18	-
округла	14,77	-	11,87	-	15,59	-
Плазмітична частка, площа, %	4,55	-	5,19	-	-	-

\* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ ; \*\*\* $p < 0,001$ .

Sakuramono

на 8 і 1,24 кг. Найвищий добовий надій був у первісток господарства "Україна", у генотипу 1/8ЧР × 7/8Г — 24,3 кг ( $P < 0,05$ ).

Глибина вим'я є важливою селекційною ознакою для визначення його технологічності, вираженням якої є показник відстані від дна вим'я до підлоги. За результатами дослідження у всіх тварин оцінюваного поголів'я він перебуває у межах 62,3-66,84 см залежно від генотипу і господарства.

При підвищенні кровності у первісток у розрізі всіх господарств не виявлено вірогідного збільшення глибини передніх чвертей вим'я.

Вим'я у помісей міцно прикріплене до тіла, з добре вираженими молочними венами, покрите тонкою еластичною шкірою. Дно вим'я в основному горизонтальне.

Придатність корів до машинного доїння характеризує також форма, розмір і розміщення дійок. Форма дійок у первісток досліджуваних груп в основному циліндрична або конічна. Дійки спрямовані вниз. За визначеними промірами середня довжина передніх дійок у дослідних тварин становить 5,68-5,36-5,51 см з діаметром 2,29-2,23-2,18 см; задніх — 5,08-4,86-5,04 см з діаметром 2,21-2,11-2,18 см залежно від середнього по господарству. Такі розміри дійок дають змогу без перешкод видовювати тварин механічним способом. Статистичні дані показали: найбільш різноманітними виявилися розміри дійок, що дає можливість вести відбір за цими ознаками.

Серед функціональних властивостей вим'я головне місце відводиться показнику швидкості доїння, який залежить переважно від величини добового надою, рівномірності розвитку і функцій окремих його чвертей.

Дані досліджень свідчать, що у помісних первісток із збільшенням частки "умової кровності" за голівтином спостерігається вірогідне підвищення величини добового надою (табл. 2).

Тварини генотипу 1/16ЧР × 15/16 Г у ПАП "Україна" деяко поступаються перед первістками генотипу 1/8ЧР × 7/8 Г, що ми пояснююмо більшою їньою вимогливістю до збалансованості раціонів і умов годівлі.

За даними наших дослідень установлено, що не існує певної закономірності у зміні тривалості доїння у первісток у зв'язку з підвищеннем кровності за голівтином. Проте швидкість до-

*2. Фізіологічні особливості вим'я коріє-персісток*

Показник	Репродуктивні характеристики				$M \pm m$	$C_V, \%$	$C_V, \%$
	$M \pm m$	$C_V, \%$	$M \pm m$	$C_V, \%$			
<i>ІІІ ЧР <math>\times</math> ІІІ Г, n = 88</i>							
Надій за добу, кг	22,4 ± 0,19	8	24,3 ± 0,13***	6	23,4 ± 0,14***	4	
Тривалість дойння, хв	11,49 ± 0,22	18	11,10 ± 0,11	12	10,8 ± 0,11	9	
Швидкість дойння, кг/хв	1,93 ± 0,04	18	2,19 ± 0,05***	23	2,18 ± 0,02***	8	
Індекс вим'я, %	47,51 ± 0,55	11	48,1 ± 0,08	2	46,01 ± 0,13	2	
<i>ІІІ ЧР <math>\times</math> ІІІ Г, n = 135</i>							
Надій за добу, кг	14,4 ± 0,21	9	14,9 ± 0,25	10	17,54 ± 1,09*	9	
Тривалість дойння, хв	9,2 ± 0,17	11	7,46 ± 0,17***	14	8,82 ± 0,54*	16	
Швидкість дойння, кг/хв	1,58 ± 0,02	9	1,89 ± 0,03***	8	1,99 ± 0,06***	7	
Індекс вим'я, %	46,39 ± 0,2	3	47,81 ± 0,18	2	46,71 ± 0,42	2	
<i>ІІІ ЧР <math>\times</math> ІІІ Г, n = 37</i>							
Надій за добу, кг	14,4 ± 0,21	9	14,9 ± 0,25	10	17,54 ± 1,09*	9	
Тривалість дойння, хв	9,2 ± 0,17	11	7,46 ± 0,17***	14	8,82 ± 0,54*	16	
Швидкість дойння, кг/хв	1,58 ± 0,02	9	1,89 ± 0,03***	8	1,99 ± 0,06***	7	
Індекс вим'я, %	46,39 ± 0,2	3	47,81 ± 0,18	2	46,71 ± 0,42	2	
<i>ІІІ ЧР <math>\times</math> ІІІ Г, n = 21</i>							
Надій за добу, кг	14,7 ± 0,26	8	15,8 ± 0,38*	10	16,3 ± 0,2***	5	
Тривалість дойння, хв	9,57 ± 0,28	14	10,07 ± 0,24	11	10,3 ± 0,24	10	
Швидкість дойння, кг/хв	1,55 ± 0,03	1	1,57 ± 0,08	7	1,59 ± 0,03	9	
Індекс вим'я, %	47,43 ± 0,3	3	47,32 ± 0,27	2	47,68 ± 0,22	2	
<i>ІІІ ЧР <math>\times</math> ІІІ Г, n = 19</i>							
Надій за добу, кг	14,7 ± 0,26	8	15,8 ± 0,38*	10	16,3 ± 0,2***	5	
Тривалість дойння, хв	9,57 ± 0,28	14	10,07 ± 0,24	11	10,3 ± 0,24	10	
Швидкість дойння, кг/хв	1,55 ± 0,03	1	1,57 ± 0,08	7	1,59 ± 0,03	9	
Індекс вим'я, %	47,43 ± 0,3	3	47,32 ± 0,27	2	47,68 ± 0,22	2	

\* $P < 0,05$ , \*\* $P < 0,01$ ; \*\*\* $P < 0,001$ .

\* йння при цьому збільшується. У ПАП "Україна" вона достовірно вища, ніж у ровесниць інших господарств ( $P < 0,001$ ). Визначено, що у ПАП "Нива" у першісток генотипу 1/4ЧР  $\times$  3/4Г тривалість дойня достовірно нижча на 4,03 хв ( $P < 0,001$ ), ніж у ровесниць того самого генотипу в ПАП "Україна" і на 2,61 хв, — ніж у п/г "Шманьківчики". Не зважаючи на найвищі показники тривалості дойня у тварин ПАП "Україна" та достовірно вищий добовий надій у телиць усіх генотипів, у них більший також показник швидкості дойня. Він становить 1,93-2,14-2,18 кг/хв проти 1,58-1,89-1,99 кг/хв у ПАП "Нива" і 1,55-1,57-1,59 у п/г "Шманьківчики".

Дані дисперсійного аналізу свідчать, що частка впливу генотипу на прояв ознаки швидкості дойня ( $\eta_x^2 = 0,056-0,370-0,013$ ) незначна, відчутило вища дія паратипів факторів ("Україна"  $\eta_x^2 = 0,944$ ;  $P < 0,001$ ; "Нива"  $\eta_x^2 = 0,630$ ;  $P < 0,001$ ; "Шманьківчики"  $\eta_x^2 = 0,987$ ;  $P > 0,05$ ).

Вивчення величини індексу вим'я показало, що у всіх господарствах країцм він був у тварин генотипу 1/4ЧР  $\times$  3/4Г та 1/8ЧР  $\times$  7/8Г — у межах 47,32-47,81% та 46,71-48,1% відповідно, хоча різниця статистично не вірогідна.

У ході досліджень установлено корелятивні зв'язки між морфофункциональними ознаками вим'я та добовим надоем у період оцінки.

Доведено, що між морфофункциональними ознаками вим'я та величиною добового надою існує певний корелятивний зв'язок. Виявлена позитивна кореляція у тварин усіх генотипів у розрізі господарств між добовим надоем та обхватом вим'я ( $r = 0,645-0,378-0,670$  у ПАП "Україна";  $r = 0,193-0,105-0,745$  у ПАП "Нива";  $r = 0,332-0,192-0,604$  в п/г "Шманьківчики"), шириною вим'я ( $r = 0,602-0,281-0,689$ ;  $r = 0,208-0,005-0,610$ ;  $r = 0,226-0,206-0,585$  відповідно), довжиною вим'я ( $r = 0,629-0,296-0,683$ ;  $r = 0,159-0,161-0,699$ ;  $r = 0,178-0,241-0,619$  відповідно).

**Висновки.** Таким чином, за результатами досліджень можна стверджувати, що з підвищенням "умовної кровності" за голштином у корів української чорно-рябої молочної породи поліпшуються морфофункциональні особливості вим'я, характерні

молочному типу худоби. Значна мінливість показників і наявність кореляційних зв'язків між морфологічними та функціональними ознаками вим'я і надоем дають змогу вести селекційну роботу, використовуючи відбір за певними якостями, у напрямку підвищення молочної продуктивності худоби.

1. Буркат В.П. Використання голштинів у поліпшенні молочної худоби. - К.: Урожай, 1988. - 104 с.
2. Власов В.И., Вишневский Л.В. Продуктивные качества и морфофункциональные свойства вымени помесных животных // Новые методы селекции и биотехнологии в животноводстве. - К., 1991. - С. 63-64.
3. Гавриленко М.С. Оцінка молочних корів за стійкістю лактації // Тваринництво України. - 2002. - № 3. - С.17-19.
4. Эйснер Ф.Ф. Племенная работа с молочным скотом. - М.: Агропромиздат, 1986. - 183 с.
5. Оценка и отбор коров по пригодности к промышленной технологии производства молока / Ф.Л. Гарьковый, А.П. Солдатенко, В.М. Стародубцев и др. - М., 1985. - 28 с.

### **МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫМЕНИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ. Т.С. Ящук, О.Я. Мединская**

*Изложены результаты оценки коров-первотёлок чёрно-пёстрой молочной породы за развитием морфологических и функциональных признаков вымени.*

**Порода, морфологические признаки, функциональные особенности, вымя**

### **THE MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTER OF THE UDDER COWS UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. T. S. Yashchuk, O. Medinska**

*The investigation cows Ukrainian black-and-white dairy breed on the development morphological and functional character of the udder.*

**Dairy breed, morphological and functional character, udder**