

РІСТ ТЕЛИЦЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Викладено результати досліджень щодо динаміки живої маси за віковими періодами телиць голштинської породи залежно від їхньої лінійної належності.

Лінії, телиці, жива маса

Розведення молочної худоби за лініями є класичним методом удосконалення порід. Доведено, що цей метод розведення євищим ступенем селекційно-племіної роботи, який дає змогу найбільш повно реалізувати цінні господарські корисні ознаки родоночальників, зробивши їх надбанням для тварин усієї лінії. Попри різnobічні результати досліджень та численні узагальнення [1–7], окремі питання (подальший розвиток теорії, методи створення й удосконалення ліній, ріст і розвиток ремонтного молодняку, тривалість господарського використання та довічна продуктивність тварин тощо), залишаються і наразі актуальними.

З огляду на зазначене, метою наших досліджень було вивчення динаміки живої маси телиць голштинської породи європейської селекції залежно від лінійної належності.

Матеріали і методи дослідження. Базою дослідження слугували матеріали зоотехнічної звітності племрепродуктора АФ “Шахтар” Донецької області. Система вирощування телиць голштинської породи в господарстві передбачає їхнє утримання до двомісячного віку в індивідуальних будиночках просто неба, в подальші вікові періоди — безприв’язне, стійлово-вигульне з обладнанням вигульно-кормових майданчиків (стійловий період) і влітку — в таборах. Зав'язування телиць проводили шомісяця. Корегування живої маси на ювілейну дату здійснювалось за програмою СУМС “Орсек” на ПЕОМ.

Результати дослідження. Одним із важливих показників росту тварин є вікова динаміка живої маси. Ремонтних телиць у господарстві вирощували за інтенсивною технологією з метою досягнення жи-

© М.С. Гавриленко, Н.В. Куновська, 2005

Розведення і генетика тварин. 2005. Вип. 38

вої маси у віці 6 міс. — 180—190 кг, 12 — 320—340 і 18 — 420—430 кг, при осімененні — 410—420 кг, перед отеленням — 600—650 кг.

Дослідження змін живої маси телиць у період вирощування залежно від їхньої лінійної належності свідчать про вірогідну різницю в показниках, особливо до шестимісячного віку (таблиця).

Жива маса телиць голштинської породи за віковими періодами

Лінія (кличка і номер родона- чальника)	п	Жива маса (кг) у віці, міс.							Вік плідного осіме- ніння, дні
		3	6	9	12	15	18	при плідному осіме- нінні	
Старбака 352790	131	92±2 ^{***}	188±1 [*]	268±2 [*]	333±2	385±2	425±3	420±3	526±5 ^{**}
Елівейшина 1491007	64	97±2 [*]	192±3 [*]	272±3	335±4	390±6	429±4	439±5	515±6 ^{**}
Чіфа 1427381	55	94±1 ^{***}	185±2 ^{**}	269±2	334±3	385±3	423±3	419±4	532±7 ^{**}
Белла 1667366	21	101±2 ^{***}	189±2	273±4	339±5	392±5	431±5	424±7	531±12 ^{***}
Валіанта 1650414	6	99±5	191±8 [*]	268±5	333±10	388±12	425±14	432±13	563±24 ^{**}
Кевеліє 1620273	5	102±4 ^{**}	196±4 ^{**}	286±7 ^{**}	334±6	392±10	415±9	404±16	477±13 ^{**}

* P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.

Помітна різниця спостерігалася між тваринами, які належали до різних ліній, також у віці їхнього плідного осіменіння. Теляці, які належали до ліній Кевеліє та Елівейшина, мали на 46—36 днів менший вік осіменіння порівняно з ровесницями ліній Валіанта і Чіфа.

Аналіз вікової динаміки живої маси телиць залежно від походження за батьком (вісім бугайліній Старбака 352790) відкрив істотну міжгрупову диференціацію за даним показником.

Висновок. На підставі проведених досліджень установлено відмінності за живою масою голштинських телиць у окремі вікові періоди залежно від їхньої лінійної належності та походження за батьком.

1. Буркат В.П. К вопросу о теории разведения по линиям // Ж. зootехническое производство. — 1983. — № 3. — С. 35—36.

2. Иванова О.А. Генетические основы разведения по линиям // Генетические основы селекции животных. — М.: Наука, 1969. — С. 162–207.
3. Карпова О.С. Заводской линии — права гражданства в селекционном законодательстве// Зоотехния. — 2002. — № 2. — С. 13–14.
4. Кисловский Д.А. К вопросу о разведении по линиям: Избран. соч. — М.: Колос, 1965. — С. 509–518.
5. Кравченко Н.А. Племенной подбор при разведении по линиям. — М.: Госсельхозиздат, 1954. — 264 с.
6. Проценко М. Ю., Вінничук Л. Т., Капінос Г. Й. Розведення сільськогосподарських тварин. — К.: Вища школа, 1987. — С. 213–216.
7. Полупан Ю. П. Методи визначення ступеня фенотипової консолідації селекційних груп тварин // Вісн. аграр. науки. — 2002. — № 1. — С. 48–52.

РОСТ ТЕЛОК ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Н.С. Гавриленко, Н.В. Куновская

Изложены результаты исследований по динамике живой массы по основным возрастным периодам телок голштинской породы в зависимости от их линейной принадлежности.

Линия, тёлки, живая масса

GROWTH OF HEIFERS HOLSTEIN BREED DEPENDING ON THEIR LINE BELOUGING. N. Gavrilenko, N. Kunovskaya

This article gives a review of the results of research on the dynamics of body weight of Holstein heifers depending on their line breeding belonging.

Line, heifers, body weight